



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

Grandes Cultures

POITOU - CHARENTES

Bulletin Technique n° 25 du 18 Septembre 2002 - 1 page

COLZA

Ravageurs

Limaces

La climatologie actuelle n'est pas favorable aux limaces, mais doit le redevenir à partir de Jeudi et pour les cinq jours qui suivent.

La surveillance devra donc être maintenue sur les parcelles qui n'ont pas encore atteint le stade B2, ou qui ont été ressemées. Voir les préconisations du bulletin N° 23.

Petites altises

La pression du ravageur est loin d'être uniforme, mais des dégâts sont signalés çà et là sur l'ensemble de la région.

Surveillez vos cultures jusqu'au stade B2 et intervenez si vous avez 30 % des pieds touchés (voir bulletin N° 23).

Tenthredes

On approche des 1000 captures en cuvettes jaunes, le temps est très favorable au vol des adultes.

La lutte se fait sur larves, à l'apparition des premiers dégâts qui devrait intervenir fin Septembre, début Octobre. Il est trop tôt pour intervenir.

Grosses altises

Le vol a juste débuté (2 captures en Charente-Maritime).

Il est trop tôt pour intervenir.

Maladies

Phoma

Comme indiqué dans la note commune SRPV-CETIOM du 08 Août 2002, l'appréciation du risque parcellaire phoma est résumée dans la grille ci-dessous.

Les observations des dernières campagnes ont conduit à modifier sensiblement les critères d'évaluation.

1- Grille de risque Phoma

VARIETE	RISQUE ELONGATION	RISQUE PHOMA
PS : Capitot, Madrigal, Cordial, Constant, Explus	Fort	Elevé
S : Extra, Orlando, Royal, Bristol	Fort	
PS : Capitot, Madrigal, Cordial, Constant, Explus	faible	Faible
S : Extra, Orlando, Royal, Bristol	faible	
TPS : Pollen, Aviso, Kosto, Campala, Standing, Mendel, Montego, PR45W04		Très faible

2 - Appréciation du niveau de risque d'élongation :

- Fort risque d'élongation : levées précoces en milieux riches en azote (reliquats azotés élevés, apports de matière organique).
- Faible risque d'élongation : autres situations.

3 - Interprétation des résultats de la grille :

- L'intervention fongicide est **conseillée** au Top Avertissement (éventuel) dans les parcelles à risque phoma élevé n'ayant pas dépassé le stade B6 à cette date.

- L'intervention fongicide est **déconseillée** dans les parcelles à risque phoma très faible, quel que soit le stade de la parcelle.

- L'intervention fongicide pourrait s'envisager dans les parcelles à faible risque phoma dans certaines situations (voir prochains bulletins).

Remarque : Les variétés sensibles au phoma sont citées pour mémoire, elles sont très peu présentes dans la région.

La maturation des périthèces a débuté (site de Biard) ; son évolution et les résultats des piégeages de spores figureront dans les prochains bulletins.



COLZA

Petites altises, tenthrèdes, grosses altises:

A surveiller

CEREALES

Dépliants ITCF

Service Régional de la
Protection des Végétaux
13, route de la Forêt
86 580 BIARD
Tél: 05.49.62.98.25
Fax: 05.49.62.98.26

Directrice gérante :
S. DUTARTRE

Site Internet :
www.srpv-
poitoucharentes.com
E-mail :
srpv.draf-poitou-
charentes@agriculture.gouv.fr

Publication périodique
C.P.P.A.P. n° 2139 AD
ISSN n° 02294 470

1340 5 40830